



Rosa Noisettiana.

P. J. Redouté pinx.

Rosier de Philippe Noisette

Imprimé de Bonnard

Langlois sculp.

LES ROSES.

77

ROSA NOISETTIANA.⁽¹⁾

R. Germinibus ovatis pedunculisque villosulis; foliis glabris simpliciter argute crenatis; petiolis glanduloso-subtomentosis, aculeatis; caule aculeis validis, subrectis; floribus paniculatis. (N.)

LE ROSIER DE PHILIPPE NOISETTE.

DESCRIPTION.

Magnifique arbrisseau qui s'élève jusqu'à huit à dix pieds. Ses rameaux glabres sont armés d'aiguillons assez forts, un peu crochus, rougeâtres sur les branches florifères, et bruns sur les rameaux adultes. Les feuilles se composent de cinq à sept folioles ovales-pointues, rarement obtuses, glabres, vertes en-dessus, plus pâles en-dessous, simplement et finement crénelées: elles sont portées par des pétioles velus, munis de plusieurs petits aiguillons recourbés qui s'étendent, par-fois, jusque sur la nervure de la foliole impaire. A la base de ce pétiole sont deux stipules bifides, pointues au sommet, denticulées et glanduleuses en leur bord. Les fleurs, latérales et terminales,

(1) *Habitus.* Frutex magnitudine, circiter, 8—10 pedum. *Caeteris.* subrectis, aculeis sparsis armis. *Aculei* validi, inaequales, subrecti. *Folia*, plerumque septenna, orbiculato-ovata, basi rotundata, apice partim scuta, partim obtusa, utrinque glabra. *Petioles* subpubescentes, aculeati. *Stipulae* lanceolatae, acuminatae, margine glandulosae. *Florae* terminales, corymbosae; corymbus bracteis suffusus. *Fructus* duo simplices, saepe in pedicellis ternis divisi, bracteis ad basin usque ramificationis praediti. *Bractea* angusta, mucronata. *Calycis* tubus oblongo-oviformis, pediculi et pedicelli omnino villoruli. *Legum.* *Caryocarpium* baccis terminata, appendiculata, intus alborubescens, margine glandulis raris praedita. *Corolla* speciosa duplex, colore ex albo purpureo-roseo, saepe albida. *Petalis* obcordatis. *Fructus* ellipsoideus. *Maturum* 200 vult. Nomen ex D. P. NOISETTE, Horti-cult. in America boreali. (N.)